

Дозорець-імператор

Anax imperator Leach, 1815



Тип:	Членистоногі. Arthropoda
Клас:	Комахи. Insecta
Ряд:	Бабки. Odonata
Родина:	Коромисла. Aeshnidae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні:

Зх. (на пн. до Швеції) і Сх. (на пн. до країн Балтії) Європа, Пн. і Центральна Африка, Зх. Азія та Пн. Індія, Кавказ, Закавказзя і Середня Азія. По всій території України.

Чисельність і причини її зміни:

Незначна (поодинокі особини). За сприятливих умов концентрація личинок на дні водойм може становити 1-2 особини на 1 м². Хімічне та органічне забруднення водойм.

Особливості біології та наукове значення:

Вид населяє узлісся та лісові галявини, мешкає вздовж берегів річок, озер і ставків. Імовірно, має дворічну генерацію. Літ імаго - з червня до вересня. Хижаки, живляться дрібними літаючими комахами, зокрема кровососами. Яйця відкладають у тканини листків і стебел водяних рослин. Личинки одні з найбільших серед личинок інших бабок (досягають 60 мм); протягом життя линяють близько 12 разів. Вони теж хижаки: підстерігаючи здобич (дрібні ракоподібні, п'явки, пугловки, личинки водяних комах тощо), тривалий час можуть сидіти нерухомо на дні або серед водоростей.

Морфологічні ознаки:

Груди зелені. Основа перетиночки біла, вершина - сіра. Самці: нижній анальний придаток складає близько третини довжини верхніх анальних придатків, його довжина більша за ширину, кінці верхніх анальних придатків заокруглені. Самки: потиличний трикутник без придатків. Тіло - 83-85, крила - 45-51 мм.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Рекомендується охороняти місця перебування виду (прибережну смугу та водойми) від забруднення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.